

Bovenste ooglidcorrectie Blefaroplastie

Bovenste ooglidcorrectie

Blefaroplastie

Afhangende bovenste oogleden ontstaan door verlies van elasticiteit van de huid met het ouder worden. Hierdoor ziet u er vermoeid en ouder uit. Hangende bovenste oogleden geven soms een zwaar gevoel van de oogleden of zelfs gezichtsveldklachten. Ook kan het lastig zijn om oogmake-up aan te brengen.

Verloop van de behandeling

Bij een bovenste ooglidcorrectie wordt de overtollige huid (en soms ook overtollig vet) weggenomen waardoor u terug een frissere blik krijgt. De behandeling zelf neemt over het algemeen niet meer dan een uur in beslag. De ingreep gebeurt onder lokale verdoving. Deze injecties kunnen wat gevoelig zijn.

De insnede valt in de plooi van het ooglid zodat het litteken niet of nauwelijks zichtbaar is nadien. Meestal worden de hechtingen net onder de huid geplaatst en worden deze vastgeplakt met steristrips. Deze worden na 5 à 7 dagen verwijderd.

Voor de behandeling

- Breng geen make-up aan op de dag van de behandeling.
- Breng u arts op de hoogte als u bloedverdunners neemt. Deze zullen op voorhand gestopt moeten worden.
- Stoppen met roken bevordert een mooie genezing.

Na de behandeling

- U krijgt geen verband op de ogen na de ingreep, maar het wordt wel aangeraden om u door iemand anders naar huis te laten vervoeren.
- De oogleden zullen de eerste dagen na de behandeling gezwollen zijn. Vaak treedt er een blauwverkleuring (bloeduitstorting) van de oogleden op.
- De pijn valt meestal erg mee. Zo nodig mag u paracetamol innemen.
- Zolang er hechtingen zijn, mogen de oogleden niet nat gemaakt worden.
- Wij adviseren om twee weken niet te sporten.
- Na twee weken mag u opnieuw make-up op uw oogleden gebruiken.

Mogelijke complicaties

- Langer aanhoudende zwelling van de oogleden. Dit kan het gevolg zijn van een bloeding of opstapeling van wondvocht.
- Asymmetrie van de huidplooi van de beide bovenste oogleden. Een kleine asymmetrie is normaal, zowel voor als na de ingreep.
- Droge ogen. Dit is een zeldzame complicatie. Soms is het nodig hiervoor kunsttranen te gebruiken. Als er voor de operatie al sprake is van zeer droge ogen, is het niet aangeraden om deze ingreep te laten uitvoeren.

Complicaties bij een bovenste ooglidcorrectie zijn zeer zeldzaam. Het resultaat is vrijwel altijd goed en patiënten zijn over het algemeen erg tevreden.

Contact

Secretariaat huidziekten

Straat 53

T 09 224 64 26

artikel X | Laatste update: augustus 2021

Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opge maakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.